ESPERE LA PRUEBA

Este centro de atención médica sigue las buenas prácticas médicas y las leyes de salud pública al ofrecer pruebas de VIH a todos los pacientes mayores de 13 años de edad.

Pruebas de laboratorio de rutina

- ✓ Glucosa
- ✓ Colesterol
- ✓ Prueba de VIH
- ✓ Conteo completo de sangre
- ✓ Perfil de lípidos

Peor estado de VIH: desconocido.
La prueba le da el control.

hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

Datos importantes que debe saber antes de hacerse una prueba del VIH.

- La prueba del VIH es voluntaria y todos los resultados de las pruebas de VIH son confidenciales (privados).
- El VIH se puede contagiar a través del sexo sin protección, las agujas compartidas, el parto o al amamantar al bebé.
- El tratamiento para el VIH es eficaz, tiene pocos o ningún efecto secundario y podría involucrar tomar solo una pastilla al día.
- Las parejas pueden mantenerse seguras al conocer su estado del VIH y recibir tratamiento para el VIH o tomar profilaxis previa a la exposición (pre-exposure prophylaxis, PrEP) contra el VIH. No compartir agujas y practicar sexo seguro lo ayudará a protegerse contra el VIH, la hepatitis C y otras ETS.
- Es ilegal discriminar contra una persona debido a su estado de VIH.
- Las pruebas anónimas del VIH (sin dar su nombre) están disponibles en algunos sitios de pruebas.
- Las pruebas de VIH son una parte rutinaria de la atención médica, pero tiene derecho de oponerse o rechazar una prueba de VIH.
- Si usted desea rechazar una prueba de VIH, infórmelo al proveedor de atención médica.

La prueba del VIH es especialmente importante para las mujeres embarazadas.

- Una mujer que vive con VIH puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo, el parto o durante la lactancia materna.
- Es recomendable que conozca cuál es su estado de VIH antes de un embarazo o durante las primeras etapas de este, para que pueda tomar decisiones importantes sobre su propia salud y la salud de su bebé.
- Las pruebas de VIH se llevan a cabo tan pronto como le sea posible en su embarazo y de nuevo en el tercer trimestre con consentimiento del paciente.
- Si usted está embarazada y tiene el VIH, hay tratamientos disponibles para su propia salud y para evitar que le transmita el VIH a su bebé.
- Si tiene VIH y no recibe tratamiento, las posibilidades de transmitir el VIH a su bebé son una de cada cuatro. Si recibe tratamiento, las posibilidades de transmitirle el VIH a su bebé son mucho menores.
- Si no se hace una prueba durante el embarazo, su proveedor le recomendará que se haga la prueba cuando esté en trabajo de parto. En cualquier caso, se le hará una prueba a su bebé después del parto. Si la prueba de su bebé es positiva, esto significa que usted tiene el VIH y su bebé ha sido expuesto al virus.