

预期检测

此医疗保健机构遵循良好医疗实践和公共健康法律，向所有 13 岁及以上患者提供 HIV 检测。

常规实验室检测

✓ 葡萄糖

✓ 胆固醇

✓ HIV 检测

✓ 血常规

✓ 血脂分析

最糟糕的 HIV 情况：未知
通过检测，您可以掌控病情。

hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

接受 HIV 检测前需要知道的重要事项。

- HIV 检测是自愿行为，所有 HIV 检测结果都保密（隐私）。
- HIV 可通过无保护的性行为、共用针头、生育或哺乳来传播。
- HIV 的治疗是有效的，副作用很少或没有副作用，可能需要每天吃一片药。
- 伴侣通过了解彼此的 HIV 情况和获得 HIV 治疗或进行 HIV 暴露前预防 (pre-exposure prophylaxis, PrEP)，可确保双方处于安全状态。不共用针头并提高性行为的安全性将有助于预防 HIV、丙肝和其他性传播疾病 (STD)。
- 不得因 HIV 情况而歧视某人，这是违法行为。
- 可在一些公共检测点进行匿名 HIV 检测（无需提供姓名）。
- HIV 检测是医疗保健的一个常规部分，但您有权反对或拒绝接受 HIV 检测。
- 如果您想拒绝接受 HIV 检测请告知医疗保健提供者。

HIV 检测对孕妇尤为重要。

- 携带 HIV 的妇女在怀孕、分娩或哺乳期间可能会将病毒传播给她的孩子。
- 最好能够在怀孕前或怀孕早期知道您的 HIV 情况，以便您可以就自己的健康和孩子的健康做出重要决定。
- 经患者同意，在怀孕期间尽早进行 HIV 检测，并在第三个 3 个月期间再次检测。
- 如果您已怀孕并且携带 HIV，那么为了您自己的健康以及防止将 HIV 传播给您的孩子，您可以接受治疗。
- 如果您携带 HIV，但不接受治疗，将 HIV 传播给孩子的机率是 25%。如果您接受治疗，将 HIV 传播给孩子的机率会降低很多。
- 如果您在怀孕时没做检测，在您临产时，您的医疗保健提供者将会建议您进行检测。无论如何，您的孩子在出生后将做检测。如果您孩子的检测结果是阳性，则表示您携带 HIV，而且您的孩子感染了病毒。

